

STAP 3 Risico-inschatting en risicofactoren voor selectie patiënt voor medicatiebeoordeling

Onderwerp: Medicatiebeoordeling

Versie: september 2026

Risico-inschatting

- Een medicatiebeoordeling kan geïndiceerd zijn bij patiënten met meerdere geneesmiddelen en aandoeningen en/of een vastgestelde kwetsbaarheid.
- Kwetsbaarheid is een dynamisch begrip en kan worden onderverdeeld in de volgende domeinen: fysiek, cognitief, sociaal en psychisch. Kwetsbaarheid kan tijdelijk zijn en ook situationeel.
- Signalen van knelpunten bij medicijngebruik. Voorbeelden van factoren die meegewogen kunnen worden zijn: a) bijwerkingen, b) gebruiksproblemen, c) functionele achteruitgang, d) toename van pijn of vermoeidheid, e) veranderingen in zorg of leefsituatie, f) wijzigingen in medicatie of behandelregime.
- Overweeg bij patiënten waarbij de apotheker inschat dat de zorgvraag minder complex is een andere vorm van evaluatie van de medicatie.

Risicofactoren kwetsbaarheid

- Multimorbiditeit
- 1 of meer geriatric giants (vallen, ondergewicht, incontinentie, decubitus, depressie, communicatiestoornis)
- Ontbreken sociaal netwerk
- Frequent praktijkbezoek
- Relevant nierfunctieverlies
- Recent verlies van een partner
- Alleenstaand zijn
- Moeite hebben eigen regie te voeren
- Een lage opleiding
- Laaggeletterdheid
- Een recente ziekenhuisopname
- Een overbelaste mantelzorger
- Polyfarmacie (5 of meer medicijnen)
- Frequent gebruik huisartsenspoedpost/SEH