

# Protocol oncologisch ulcus

wondbehandeling als er sprake is van pijn →	Zie protocol algemene adviezen wondbehandeling <a href="#">Richtlijn pijn NHG</a>
wondbehandeling als er sprake is van een bloeding →	Gebruik altijd donkere handdoeken en zorg, bij kans op levensbedreigende bloeding, dat er Midazolam aanwezig is voor eventuele sedatie. <ul style="list-style-type: none"> <li>• gering: bij voldoende exsudaat een alginaat in verband met de hemostatische werking</li> <li>• matig: hemostatische middelen (alginaat gedrenkt in Xylometazoline of tranexaminezuuroplossing)</li> </ul>
wondbehandeling als er sprake is van jeuk →	<ul style="list-style-type: none"> <li>• afhankelijk van de oorzaak jeuk: lokaal Antimycoticum of Corticosteroid, eventueel in combinatie met vocht inbrengende crème bijv. Cetomacrogol of Koelzalf</li> <li>• aandacht voor luchtige kleding</li> <li>• voorkom hoge temperaturen</li> <li>• zorg voor voldoende vochtintake</li> <li>• controleer op overgevoeligheid voor het gekozen verband of de crème</li> </ul>
wondbehandeling als er sprake is van een sterke geur →	<ul style="list-style-type: none"> <li>• reinig de ulcus door te spoelen met water</li> <li>• Metronidazol zalf, eventueel aanvullen met antibacterieel spoelvloeistof in spray (Prontosan of Advasyn)</li> </ul>
wondbedekking met exsudaat DD* infectie, lymfevocht →	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rood (let op, dit is geen granulatieweefsel maar tumorweefsel): beschermen met zacht, niet verklevend absorberend verband</li> </ul>

[Patiëntinformatie: Behandeladvies wondbehandeling](#)

[Informatie oncologisch ulcus](#)